不孕自療法（七）

朱振聲

（六）求孕者先宜保養其心腎

嚴冬之後。必有陽春。是知天地之間。不收斂則不能發生。自然之理也。今人旣昧收藏之理。縱慾竭精以耗眞氣。及其無子。旣云血冷。又爲精寒。燥熱之劑投而眞陰益耗矣。安得而有子。大抵無子之故。不獨在女。亦多由男。房勞過度。施洩過多。精淸如水。或冷如冰。及思慮無窮。皆難有子。蓋心主神。有所思。則心馳於外。致君火傷而不能降。腎主智。有所勞。則智亂于中。俾腎虧而不能升。上下不交。水火不媾。而能生育者無有也。（王宇泰）

（七）求孕先宜聚精

聚精之道。一曰寡慾。二曰節勞。三曰息怒。四曰戒酒。五曰愼味。腎爲精之府。凡男女交接必擾其腎。腎動則精血隨之而流。外雖不洩。精已離宮。未能堅忍者。必有眞精數點隨陽痿而溢出。此其驗也。故貴乎寡慾。精成于血。不獨房室之交。損吾之精。凡日用損血之事。皆當深戒。如目勞于視。則血于視耗。耳勞于聽。則血以聽耗。心勞于思。血以思耗。隨事節之。則血得其養。而與日俱積矣。故貴乎節勞。主閉藏者腎也。司疎泄者肝也。二臟皆有相火。其系上屬于心。心君火也。怒則傷肝。而相火動。動則疎洩用事。閉藏不得其職。雖不交合。亦暗流潛耗矣。故貴乎息怒。人身之血。各歸其舍。則常凝。酒能動血。人飲酒則面赤。手足俱紅。是擾其血也。血氣旣衰之人。數月無房事。精始厚而可用。使一夜大醉。精隨薄矣。故宜戒酒。經云精不足補以味。濃郁之味。不能生精。惟恬淡者能補精耳。蓋萬物皆有眞味。調和勝。眞味衰矣。不論腥素。淡煮得法。自有一段冲和恬淡之氣。益人腸胃。洪範論味。而曰稼穡作甘。世物惟有穀得味之正。但能淡食穀味最能養精。如煮粥飯中。有厚汁滾一團者。此米之精液所聚食之最能主精。故宜愼味。（袁了凡）

（八）求孕者當擇時交合

天地生物。必有絪縕之時。萬物化生。必有樂育之候。猫犬至微。將受娠也。其雌必狂呼而奔跳。以絪縕樂育之氣。觸之不能自止耳。此天然之節候。生化之眞機也。凡婦人一月經行一度。必有一日絪縕之候。于一時辰間。氣蒸而熱。昏而悶。有欲接不可忍之狀。此的候也。此時逆而取之。則成丹。順而施之。則成胎矣。（袁了凡）

（九）種子之道有四

種子之道有四。一曰擇地。地者母血是也。二曰養種。種者父精是也。三曰乘時。時者精血交感之會合也。四曰投虛。虛者去舊生新之初是也。（王宇泰）

（十）求孕補養不可用壯陽藥

種子而用壯陽燥劑。是房中術。非毓麟法也。男子當壯年不能遂欲。固由先天精氣不足。亦因心相兩火。虛而易動。腎水又無所蓄蘊。故易於疏洩。徒壯相火。腎水被刦。氣愈不能堅固矣。譬之燈火不明。添油乎。加火乎。此間自有至理。必須溫養水中之火。加以血肉有情者。塡補精氣。俾精充生氣。氣固聚精。自無不效之理。經云。不足者補之。此類是也。（顧曉瀾）

努力改進研究中國醫藥學說

中國北方惟一富有建設性的醫學刊物

醫學雜誌（特別優待減價廣告）

▲中醫改進研究會出版　常務理事時逸人主編

◘內容—分特載、醫務紀要、論壇、醫藥學說、專著、生理、衛生、處方、藥物、病理、診斷、證治叢談、醫案、通訊等欄。

◘宗旨—整理舊學。輸進新知。以組成有系統之學說。謀醫學上革新之建設。

◘目的—溝通中西。造成廿世紀之新醫學。使中醫合國際化。

◘取材—披露國粹精華。吸收科學實驗。

◘方針—發揮上古醫學之精神。擴充治療應用之方法。

本會爲提倡社會醫學知識民衆衛生起見特將所存十餘年醫學雜誌全部減價出售此啓

費一元之代價訂閱醫學雜誌全年如與全國名醫對晤一室

已出雜誌—按照每冊定價。一律八折。—減價出售。

未出雜誌—預訂全年—祇收一元。—郵力外加一角。郵票代洋九五。

（同時預定五份者加一份（即六人同時訂閱祇收五份）代價洋五元郵力洋五角）預訂十份以上者加贈二份）

整售辦法—自第一期起。至現期止。爲一全份。同時購一全份者。贈中國時令病一冊。中醫建設問題一冊。藥物學一冊。同時購五全份以上。除照上列三種醫書各贈二冊外。加贈雜誌一全份。同時購十部以上者。照上列各書。各贈五冊外。並加贈雜誌二全份

出版信用—本會發行雜誌。已十餘載。遵守出版信用。決無愆期停頓之患。

缺報照補—前缺第五。第七。兩期現已再版補印。閱者如缺少第五第七兩期者。請向本雜誌發行股補購可也。

全年彙編—全年六期。彙編成一巨帙。擬從二十一年起將六十三期。至六十八期。成一彙編。以後每年所刊雜誌。均彙編成一巨帙。定價仍與雜誌同。

雜誌定價—一至五十四期。每冊一角五分。五十五期以後。每冊二角五分。優待八折。郵力均須外加。郵票代價九五。

定期出版—每二個月出版一期。全年共出六期。現已出至六十七期。一至現期。首尾齊全。

試閱辦法—請惠郵票二十分。卽以一期奉贈。但不能限定期數。

發行地址—山西太原市精營東二道街。北首。中醫改進研究會。雜誌發行股。

上海幸福書局出版

書名	冊數	價目
百病自療叢書	十冊	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
婦女病初集	一冊	實售大洋五角
婦女病續集	一冊	實售大洋五角
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保腦新書	一冊	實售大洋四角
怪病奇治	一冊	實售大洋一元
花柳病療學	一冊	實售大洋三角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
幸福報第七集彙訂	二冊	實售大洋一元四角

書名	冊數	價目
虛勞五種	一冊	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四冊	實售大洋二元二角
實用驗方	一冊	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一冊	實售大洋二元
國民醫藥須知初集	二冊	實售大洋二元
國民醫藥須知二集	一冊	實售大洋一元八角
遺精房論	一冊	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四冊	實售大洋二元四角
清代醫案精華	四冊	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四冊	實售大洋二元四角

書名	冊數	價目
中西醫藥講義	廿冊	實售大洋八元
醫學南針	二冊	實售大洋一元二角八分
中國針灸治療學	一冊	實售大洋二元八角
衛生寶鑑	四冊	實售大洋二元[illegible]分
衛生叢話二集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話三集	一冊	實售大洋四角五分
衛生叢話四集	一冊	實售大洋五角
學校衛生要旨	一冊	實售大洋四角五分
失眠自療法	一冊	實售大洋二角
癆病自療法	一冊	實售大洋二角

地址上海三馬路雲南路轉角

長壽

于右任

每份四分　第二十二期

中華民國念一年十一月四日

每逢星期五出版　全年五十期連郵二元　國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

◉本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◉

本期目錄

治壁虎咬傷方
女子失血較男子易於復原
血症之急救方
病家須知
治凍瘡效方
伏暑醫療南鍼（八）
育兒日記（十七）
一百八十九種痛症之治法（十八）
肝逆嘔吐
火灸驗方
小兒哮咳
黃連有消食之效
遺精耳鳴
目光昏糊
腳氣之治法
梅毒鼻腫
反胃無憂
三陰瘧疾
痢疾自療法（二十）
不孕自療法（七）

女子失血較男子易於復原

徐以儒

（一）失血的危險

甚麼叫做失血。失血就是失去了吾人身體內最寶貴的血液。例如刀砍呀。釜鑿呀。跌撲呀。亂傷呀。以致皮肉哆開。血管破裂。血流不止。這便叫做出血。小血管破裂。比較容易遏止。假使大血管破裂。那便非行血管紮結法不可了。不用藥線。不把血管紮結起來，血是不會住的。血流不止。那便立時有生命的危險。

（二）失血後怎會復原

我們受了種種的外傷。以致出血。就是失血。但是失去了血。必定要有新生的血來補償起來。使得流血易於恢復康健。人類生理上。天然有這種恢復能力。只要止了血。便會一天一天體內生出新血來補償。新血是從那裏生出來的呢。從飲食內生出來的。如受傷後。傷處不發熱𤷪脹。局部經過良好。無多大的痛苦。飲食很有胃口。這樣飲食壯健。其滋養的成分。吸收到體內。便會生出新血來。又有服補血劑。而直接補充體內失出的血液的

（三）男子沒有女子的容易復原

假如同治一個失血症。一個是女子。一個是男子。在治療的經過中。往往婦女的失血症。恢復起來。較男子爲速。當失血的時候。顏色蒼白。形容枯槁。皮膚亦呈蒼白色。似呼很爲危險。一旦血止之後。服藥調理。不到幾天。便氣色大轉。蒼白的皮膚。一變而爲紅潤。看出血程度的如何。可能於十天二十天或一個月中。完全恢復原有狀況。這是我們常見的。若在男子。則恢復起來。決沒有這樣快。要遲緩得多哩。

（四）女子失血爲甚易於復原

女子有一種生理上的失血。就是月經。不期而然的滿一個月。經水便來了。只要三五天工夫。自然會沒有了。所以女子這種失血。自然而來。自然而止。是有定期補償性的。漸漸造成了一種補償性的習慣。所以遇到外傷等非定期的失血。補償起來。也就較男子爲速。所以易於復原了。

◘病家須知

（義德）

一、患病求醫。必先究問病原。而後用藥。若迷信神佛。吞服仙方。藥石誤投。往往死於非命。

二、無論患何疾病。須立卽延醫診治。

三、延請醫生。須選擇學識經驗充足者。

四、病家延醫。須具十分信仰之決心。不宜時常更換。恐醫生審病不同。誤投藥石也。

五、醫生之言。病家須絕對服從。如病未痊可。吝於服藥。他日舊症復發。病家之精神與金錢。所受損失必更大。

六、病者飲食。最易生厭。然不可一任病者之心理。隨意取食。蓋飲食不愼。有碍病體之復原。

七、病家之飲食用具。必用沸水消毒。以防傳染。

八、病之被褥。宜常晾晒。利用日光消毒。

九、疾病初愈。尤宜注意飲食。毋求過飽。食料以富於營養滋補者爲宜、堅硬辛酸葷腥之類。不可食。

十、病後操作。不宜過度。恐傷身體。

代郵

大團李永平君鑒。示悉。貴恙由於腎陰不足。膀胱鼓舞無權所致。故爲精關不固。爲膀胱作脹也。治宜雙方兼顧。早服滋腎通關丸三錢白開水吞服。晚服金鎖固精丸三錢淡鹽湯吞服。此方連服一星期。以覘進止。忌服煙酒及一切發物。爲要。

本館施送良藥

自國歷十一月一日起。先行施送一月。分文不取。以面取爲限。恕不郵寄。逾期出售。

神妙萬應膏藥　凡癰疽發背及一切無名腫毒屢試屢驗其効如神

立止瘧疾膏藥　不論日日間日三日均能奏效

速效黃水瘡散　隨敷隨效百發百中

神効凍瘡膏藥　患凍瘡者不論已潰未潰均能奏效並且立止痠痛

介紹金耳補品

上海白克路寶隆醫院對面華發建業公司發明之金耳補品。確能補腎滋陰。健脾養胃。補血潤腸。功效卓著。有口皆碑。凡本報讀者。而欲嘗試或購服金耳者。可向本報館索取送嘗優待。及九折優待券。分文不取。

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

伏暑醫療南鍼（八）

宋愛人

△爲現在時令病之新貢獻
△爲臨牀診斷學之結晶品
△演繹中醫數千年之眞實學理
△糾正一般下工醫之藥不對證

▲伏暑病理學總論
▲伏暑證治辨論

（按）辨暑之與濕孰多孰少其第一主要總以脈舌爲標準如上述證狀不過舉其要耳餘再詳後

雖然伏暑邪陷胞絡原是危惡之候然而邪既陷入胞絡矣則他經難保其必無有不同時俱病者於是有兼見耳聾脇痛目眩善嘔之少陽證者有兼見煩躁不眠或多眠睡之陽明證者有兼見自利鶩溏發黃腹滿之太陰證者有兼見咽傷喉爛齦血齒枯或欲寐蜷臥自利純青之少陰證者有兼見筋脈痠痙體厥脈厥或消渴吐蚘便利膿血之厥陰證者總之邪之循經猶水之注窪就其坎窟潮濕而益甚也然要以陽氣生存邪易鬆透陽氣消亡邪易沉降陰氣生存泉源有恃陰氣消亡泉源立竭此人之所以宜葆養於平日而醫亦當周護病人之陰陽也若悞汗傷陽悞下傷陰早用寒涼則傷陽過用溫燥則傷陰此則醫之罪矣伏暑然萬病皆然焉

論伏暑初起邪留膜原多有寒熱如瘧幷出治法（一）

在胸之上脘之下分行兩脇腰臍其間爲藏府分界之隔膜者曰膜原以形體言爲臟腑壁膜交界之脂膜也以氣化言爲藏府氣血交通之門戶也故邪留膜原卽有出腑入藏之傾向此處病象常有寒熱錯雜者卽正氣與邪氣交爭於膜原之或在外或在內也或者說寒熱往來爲少陽證（膽經）不知陽明（胃經）亦有蒸蒸發熱淅淅惡寒厥陰（肝經）亦有煩躁厥逆寒熱錯雜凡在經腑之間者皆有寒熱交爭之可能性也惟有微甚之不同耳

況本證寒熱如瘧最易神昏肢冷脈伏模糊而一經化熱尤易唇焦齒血少陽表證無此凶惡也其舌苔必白如積粉而舌底多紅絳起刺少陽證無此脈舌也治之之法以苦溫洩化爲最佳柴胡湯非其治也

◉一百八十九種痛症之治法（六）

朱振聲

（六十二）熱毒攻手腫痛欲脫

手臂腫痛。乃爲熱毒所乘。如限於局部。全身不受影響。或水煮馬糞洗之。如身體感受不快者。再用黃連一錢。川軍錢半。連翹三錢。赤芍三錢。銀花三錢。生甘草一錢。煎服

（六十三）雞眼觝痛

疾行遠走。或鞋履過窄。壓制及磨擦過甚。其着力處。卽生一旋螺紋之贅肉。突出於上。日久益堅。高凸愈甚。觝觸則疼痛。用紫玉簪花根搗爛塗之。或用烏梅肉搗爛。調鎭江醋少許。再加鹽水調敷。

實用驗方

本欄歡迎讀者投稿

■火燙驗方

用老石灰浸水。調茶油擦之。良愈。若能預用老石灰置甁中。每年約端午日添水入甁。預儲應用。尤妙。又方用熟煙絲。和水。搗如米漿。時時擦之。卽不疼痛。亦不發泡。若以此方治水燙更妙。

■黃連有消食之效

黃連一物。味苦性寒。功能健胃消食。凡有積食便閉之症。可購黃連一分。研末服之有效。

■脚氣之治法

江南地卑多濕。而滬上當長江之要津。濕尤甚於內地。故上海人之患脚氣者頗多。始則視爲小恙。久則蔓延入腹。終則喘脹而斃。脚氣亦可畏矣。余有一方經治者無一不愈。法以米店之糠一撮。以夏布袋包之。冲以開水。代茶飲之。並不難服。每日更換一二次。不可間斷。不可過於功作勞苦。自能漸愈。蓋滬人所食之米。以機白爲多。機白米光而少糠。故糠爲治脚氣之特效藥。

■反胃無憂

治反胃法。以北瓜俗稱飯瓜。在初結瓜時。將根處留尺許。截斷之。以玻璃甁口適之。須緊。勿容洩氣。明日視之。有露滿甁。飲之自愈。此法得之秘傳。屢試屢驗。幸勿輕視之。

■治壁虎咬傷方

無論何人。爲壁虎咬傷。速尋一活蜘蛛。越大越好。將蜘蛛放在傷處。使蜘蛛舐毒。自然立刻止痛。

■血症之急救方

吐血。衄血。其病源由血熱妄行者最多。一時若湧出不止。頗有陰陽脫離之險。茲有急救之方。卽取鮮生地二兩。打汁。隔湯燉溫服之。立刻可止血降火。甚效。

■治凍瘡效方

凍瘡初起紅腫。可以臨睡時用棉花浸洋油少許。包貼患處。必愈。若以皮爛而痛不可忍。則以大黃一錢。研細末。用水調敷。痛卽自止。

育兒日記　觀察小兒疾病之簡單方法（續）

尤學周

（九）飲人乳之康健小兒。其大便之色。濃厚如蟹膏。均勻而少。每日約二次至四次。若作綠色或暗褐。（初生三五天之胎糞。不在此例）或混黏液。或有凝固之粒塊。每日在五次以上。卽腸胃有病之徵。

（十）小兒初生。頭圍較胸圍稍大。日久則胸圍發達。大於頭圍。若半年後。胸圍尙不如頭圍者。卽屬虛弱之徵。

（十一）小兒二歲以後。顖門頂骨猶未閉。或凹下不凸起者。係發育不良。及有病之現象。

（十二）食指靠大指一面。有筋一條。現紫色而直上指之第三節者。內熱必盛。

（十三）呼吸之數。初生兒每分鐘約有三十五次。過歲後減至二十六七次。小兒患熱病及肺病時。呼吸之數必增。

（十四）小兒脈搏。較成人爲數。每分鐘約有一百三十六次。至週歲後減至一百十六七次。十六歲後同於成人。每分僅七十五六次而已。

（十五）小兒體溫在七八歲前。約爲攝氏檢溫器三十七度八九分之譜。若降至三十五度八分以下。或升至三十七度八九分以上。其因啼哭運動飲食饑餓而致者。尙無妨碍。否則爲身體有變異。發生疾病之象。

（十六）每星期磅小兒一次。身體日瘦。體量日減。或身體過於肥胖。而皮膚少紅潤色者。均非康健之徵也。

上海新新公司
朱振聲醫士
常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元　號金不收
（乙）出診四元　路遠遞加
（丙）膏丸方四元　隔日取件
（丁）外埠問病二元　原班回件
（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓

本醫室代售各種良藥

保腦丸……專治腦漏……每盒五角
遺精散……專治遺精……每盒一元
白濁丸……專治白濁……每盒一元
神仁丹……專治時疫……每元三瓶
吐血靈丹……專治吐血……每盒五角
獺肝定痛散……專治肝胃氣痛……每盒四角

醫藥顧問

本欄問病。以本報之定戶爲限。非定戶而欲問病者。每論一症。須附問病費大洋五角。以示限制。朱振聲醫士答。

■肝逆嘔吐

（問）肝氣常發。發則胸脇苦悶。氣逆脹痛。甚則嘔吐。飲食不下。抽雅片一二筒。似覺稍舒。停半日或數小時則必復發。常抽之。又恐成癮。（衞金和）

（答）肝氣而吸雅片。暫時頗能見效。然非根本療法。且誠如足下所謂恐其成癮。此症第一宜尋快樂。不可多思多慮。心境開豁。精神舒暢。亦可減輕其發作之勢。再以藥物調治。尤易收效。

小川連五分　姜半夏三錢
廣藿香二錢　淡吳萸五分
陳廣皮一錢　杜蘇梗錢半
淡乾姜五分　川厚朴一錢
白蔻仁五分

■小兒哮咳

（問）小兒久嗽。劇時頭汗如雨。痰聲如水雞。甚則嘔吐。咯血。考之幼科方書。均云天哮咳。敢問妙方。（許步蘇）

（答）小兒肺藏嬌嫩。最易感寒咳嗽。咳久不已。胃受震動。肺部亦受損。故有嘔吐咯血現象。幼年患此。頗爲可慮。藥房出售之安福消腫膏。可以試用。（用法有仿單可憑）另用下方配服。

蜜炙麻黃四分　炙款冬七分
炙桑皮錢半　炙蘇子一錢
川貝母二錢　丹皮炭錢半
葶藶子一錢　橘皮絡（各）八分
南查炭錢半

■遺精耳鳴

（問）十七歲時。患遺精之疾。最多時一夜遺三次。百般求藥。卒無效驗。年來以生活之關係。專意於謀衣謀食。少胡思亂想。遺精已較稀。然身體並不因此而強健。反得耳鳴之疾。是夜若遺精。則耳鳴愈甚。此蓋少年斲喪過甚。腎虛之故。敢問治法。（方永逸）

（答）十七歲正發育之始。而卽患遺精。如花當含苞之際。卽遭攀折。數日一次。已覺精力不勝。一夜數次。腎氣安得而不衰。近爲衣食所迫。心思過勞。腦力尤虧。吾恐不特耳鳴。必兼見健忘或頭眩等徵象。「胡思亂想」雖已少起。而正當之思慮。亦宜減少。務使腦力有休養之機會。下方可以常服。

生熟地（各）四錢　湖丹皮錢半
青龍齒五錢　淨萸肉二錢
女貞子三錢　潼沙苑三錢
炒白芍二錢　元武板（炙）五錢
靈磁石七錢　硃茯神三錢

■目光昏糊

（問）兩目昏蒙。日暮不能見物。且畏陽光燈火。視如蓋大。瞳神縮小。隱現青光。年復一年。症狀有加無減。深恐成瞽。（朱天富）

（答）目之疾患。多由於半明不滅之燈下。視讀蠅頭小字之書。或不戒於慾。腎陰虧損。膏澤被耗。反覺眩暈。光線過強。故燭物不明。益模糊不辨。皆緣瞳神耗衰。視神經衰弱。光線過弱。失其調節之功能。下方試服十劑。以觀其效。

北沙參三錢　炒白芍二錢
穀精草三錢　大生地三錢
大麥冬三錢　青葙子三錢
炒當歸二錢　五味子五分
女貞子三錢　菟絲子三錢
煅牡蠣四錢　黑芝麻（研）三錢

■梅毒鼻腫

（問）前曾涉足花叢。傳染惡疾。後漸治愈。近忽鼻樑高腫。入暮音啞而痛。就醫診治。斷爲梅毒上攻。注射數次。尙未見效。服中藥未識能斷根否。（王元慶）

（答）梅毒上攻。前次或未斷根。遺毒伏於深處。故久而復發耳。鼻腫咽痛。火毒甚厲。恐有潰爛之虞。含有刺激性之食物。切不可食。內服清熱消毒之劑。

羚羊片四分（先煎）　天花粉四錢
京元參四錢　輕馬兜一錢
川黃連五分　大貝母五錢
湖丹皮二錢　連翹一錢
寒水石錢半　生石膏一兩
淡黃芩錢半　生甘草二錢

■三陰瘧疾

（問）鄙人患三陰瘧疾。已二年有餘。時止時發。精神大虧。面色痿黃。兩唇亦無血色。統計前後金雞納霜丸服過數瓶。中藥亦有百餘帖。或有效。或無效。辛苦備嘗。卒無復原之望。（劉佩泉）

（答）西醫謂瘧爲傳染病。首先殺其菌。金雞納霜。爲是病主藥。以其能撲滅此菌也。然祗能試於初發而體質強實之人。若體質薄弱。或久發不愈。往往失其效力。貴恙已二年有餘。血色不澤。正氣已虧。譬諸國庫空虛。社會上經濟恐慌。尙窮兵黷武。東討西伐。不特勞而無功。且反陷於不安。治當扶正以達邪。始能收兩全之效。

妙黨參二錢　青蒿梗錢半
姜半夏二錢　大紅棗四個
熟附片一錢　炙鱉甲四錢
陳廣皮一錢　生姜二片
軟柴胡八分　川桂枝六分
雲茯苓三錢　生首烏三錢

◉痢疾自療法（二十）

朱振聲

痢疾方驗（續）

【八】痢久鬱熱生毒方

下痢日久鬱熱生毒。腸中腐爛。時時切痛後重。所以多似爛炙。且有腐敗之色臭者。方用金銀花一兩。生杭芍六錢。粉甘草三錢。旱三七細末三錢。鴉胆子（俗名鴨蛋子）去皮揀成實者六十粒。右藥五味。先將三七鴉胆子用白糖水送服。卽將湯藥煎渣再服。病重者一日須服兩劑。方能見效。

【九】痢疾通用驗方

余家每至冬日。恒以白蘿蔔置在屋上。任其日曬風吹。霜打雪飄。直至立春前一日。始行取下。懸於無日處陰乾。遇有患痢者。卽和砂糖煮而食之。痢無不愈。

【十】痢疾初起方

葛根　炒苦參　陳皮　陳松蘿茶（各一斤）　赤芍（酒炒）　炒麥芽　炒山查（各十二兩）　研細末。每服四錢。水煎。連末嚥服下。小兒減半。忌葷腥麵食煎炒閉氣發氣諸物。

（按）痢之病原。總由先感暑熱。繼食生冷。暑熱爲陰寒所遏。遂鬱伏腸間而成痢。故以葛根鼓舞胃氣。陳茶苦參清化暑濕。麥芽山查以消宿食。赤芍行血。則便膿癒。陳皮調氣則後重除。惟祇宜於腹不脹痛者。蓋無腹滿拒按之症。便不須下也。

【十一】治痢疾兼有表症者

葛根（錢半）　黃芩（一錢）　黃連（五分）　甘草（八分）　水煎服

（按）痢疾無表症者易治。有表症者難治。所謂表症者。卽除大便下痢之局部症狀外。復有身熱怯寒頭疼脈浮之全體症狀也。是項全體症狀。最爲治療之掣肘。蓋以下劑蕩滌腸垢。則表邪卽有內陷之虞耳。本方以芩連治痢。卽以葛根解表。內外合治。並行不悖。此仲景立方之神妙。（是方出傷寒論）所以爲百世推崇也。

【十二】治久痢不止

石榴皮燒灰存性研末。米湯飲下二錢

（按）初痢必兼通下。久痢則當止濇。此治痢大法也。石榴皮味酸氣溫。濇腸止痢。功與御米殼赤石脂相若。故克治之。

【十三】赤痢驗方

陸定圃云。白槿花治赤痢甚效。余於杭郡學署。植數株。秋間。開花繁茂。凡患赤痢者。以花五六朵。置瓦上炙研。調白糖湯。服之皆愈。荷花池頭陳某。秋間下痢。月餘。諸藥罔效。已就危篤。亦以此方獲愈。採花晒乾藏之。次年。治痢亦效。

【十四】五色痢方

五色痢用鳳尾草此草有二種。一爲貫仲之別名。一爲金星鳳尾。治痢者。乃金星鳳尾也。金星鳳尾。葉細碎。形似鳳尾。短不滿尺。三月發苗。背有點子二行。相對有數粒至數十粒。秋後乃黃。生古牆及山石下。小者俗名骨牌草。性至冷。治熱毒下痢。有人患五色痢。諸藥罔效。用鳳尾草一大握。老倉米一勺。連鬚葱白三根。帶皮老姜三片。用水三大盌。煎至一盌。去渣。入燒酒小半盞。真蜜三茶匙。調極勻。乘熱服一小盞。移時再服。一日服盡。服二劑。痢止。調理而愈。